



# Ergo<sup>®</sup> BURZ

## Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

### Aplicaciones Foliaras

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
<b>Acelga, ajo, cebolla, espinaca, lechuga.</b>	4-6 hojas y 2 semanas después.	500 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Alcachofa, brócoli, coliflor.</b>	4-6 hojas y 3 semanas después.	600 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Aguacate, cítricos, mango.</b>	2 semanas después del inicio de la floración y durante la floración.	1000 cc /1000 L. agua	Aplicación Foliar
<b>Alfalfa.</b>	10-20 cm de altura, 2da y siguientes de 15-20 días después del corte.	500 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Algodón.</b>	Inicio de formación de cuadros, siguientes cada 3-4 semanas.	500 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Avena, arroz, cebada, centeno, trigo.</b>	Al inicio del amacollamiento.	500 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Berenjena, calabaza, chile, frijol, soya, garbanzo, sandía, pepino, melón, tomate.</b>	Inicio de floración y cada 2-3 semanas.	700 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Betabel, camote, papa.</b>	Inicio de la formación de tubérculo y cada 3-4 semanas.	800 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Fresa.</b>	Inicio de la floración y cada 2-3 semanas.	700 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Maíz, sorgo.</b>	1ra. a la aparición de 5-6 hojas verdaderas. La 2da. aplicación 30 días después.	500 cc/ha 500 cc/ha	Aplicación Foliar
<b>Flores ornamentales.</b>	10-20 cms de altura de la planta.	100 cc /1000 L. agua	Aplicación Foliar
<b>Piña, plátano.</b>	30-45 días del trasplante, 2da y siguientes cada mes.	2600 cc /1000 L. agua	Aplicación Foliar
<b>Vid.</b>	Inicio de la floración y dos aplicaciones más cada 3-4 semanas después.	800 cc /1000 L. agua	Aplicación Foliar