



# Ergo® Crop

## Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

### Aplicaciones Foliare

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
<b>Hortalizas</b> Tomate Chiles Pepino Berenjena Brócoli Coliflor Sandía Melón Calabaza	Aplicaciones continuas 1ª aplicación 8 días después del trasplante o después de la emergencia de la planta. 2ª aplicación a los 15 días. 3ª se recomienda aplicar en fase floración repetir cada 15 días y después del corte de frutos.	250-500 cc / ha  500 cc - 1.0 L / ha 500 cc / ha	Foliar
<b>Cebolla</b> Ajo Papa Camote Remolacha	Total 3 aplicaciones 1ª aplicación 15 días después de la emergencia de la planta. 2ª aplicación 15 días después de la primera aplicación. 3ª aplicación 15 días después de la 2ª aplicación.	1ª 500 cc / ha  2ª 750 cc / ha  3ª 1 L / ha	Foliar
<b>Algodón</b>	Total de 4 aplicaciones 1ª aplicación 8 días después de la emergencia de la planta. 2ª, 3ª y 4ª aplicación 15 días después de la anterior.	1ª 250 cc / ha 2ª, 3ª y 4ª usar 500 cc / ha	Foliar
<b>Frutales y Cítricos</b>	Árboles de alto porte, total 3 aplicaciones 1ª aplicación antes de la floración. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación.  Árboles de bajo porte, total 3 aplicaciones 1ª aplicación antes de la brotación. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 1.0 a 1.5 L / ha 2ª 1.0 a 1.5 L / ha 3ª 1.5 a 2.0 L / ha  1ª 0.5 a 1.0 L / ha 2ª 0.5 a 1.0 L / ha 3ª 0.5 a 1.0 L / ha	Foliar    Foliar
<b>Cultivos básicos:</b> Maiz Sorgo Trigo Arroz	Total de 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación 15 días después de emergido. 2ª aplicación antes de la floración. 3ª aplicación antes de la fructificación.	1ª 500 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 1.0 L / ha	Foliar
<b>Frijol</b> Soya	Total de 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación 8 días después de emergido. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 250 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 500 cc / ha	Foliar
<b>Caña</b>	Total de 3 aplicaciones. 1ª aplicación a los 15 días de emergido. 2ª aplicación a los 30 días después de la primera aplicación. 3ª aplicación a los 30 días después de la segunda aplicación.	1ª 500 cc / ha 2ª 1.0 L / ha  3ª 1.0 L / ha	Foliar
<b>Moras</b>	Aplicaciones continuas 1ª aplicación al inicio de la brotación. 2ª aplicación al formar los frutos. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 250 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 500 cc / ha	Foliar
<b>Floricultura</b> Ornamentales	Aplicaciones continuas Aplicar cada 15 días	250 a 500 cc / ha	Foliar