



Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
Hortalizas Tomate Todo tipo de Chiles Pepino Berinjena	Invernadero Repartir la dosis en varias aplicaciones 1ª aplicación una semana después del trasplante. 2ª aplicación 14 días después de la 1ª aplicación. 3ª aplicación 7 días después de la aplicación anterior. 4ª y 5ª aplicaciones, cada semana. Usted puede continuar aplicando esta misma dosis cada semana después de la 5ª. Cielo Abierto Repartir la dosis en 2 aplicaciones 1ª aplicación una semana después del trasplante o después de emergencia. 2ª aplicación 14 días después de la primera.	Invernadero Mínimo 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 4 L / ha 3ª 2 L / ha 4ª y 5ª 2 L / ha Cielo Abierto Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego por goteo Riego por goteo Riego rodado
Col Melón Calabacita Cebolla Sandía Ajo Brócoli Coliflor Zanahoria	Repartir la dosis en 2 aplicaciones 1ª aplicación una semana después del trasplante o después de que la planta ha emergido. 2ª aplicación 1 semana después de la primera.	Total 40 L / ha 1ª 20 L / ha 2ª 20 L / ha	Riego rodado o Riego por goteo
Frutales y Cítricos	Árboles de Alto Porte 2 aplicaciones al año según el ciclo de cada cultivo. 1ª aplicación al inicio de la floración. 2ª aplicación 6 meses después. Árboles de Bajo Porte 2 aplicaciones al año según el ciclo de cada cultivo. 1ª aplicación al inicio de la floración. 2ª aplicación 6 meses después.	Árboles de Alto Porte Total 30 L / ha 1ª 20 L / ha 2ª 10 L / ha Árboles de Bajo Porte Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego por goteo Micro aspersión Riego rodado Riego por goteo Micro aspersión Riego rodado
Papa Camote Remolacha	Aplicar a la siembra la dosis completa.	20 L / ha	Mezclado con el caldo de insumos para protección de semilla a la siembra. Agregar primero el Ergo [®] Sol al tanque.
Caña	Aplicar en el primer riego después del corte. Se puede aplicar la dosis de 30 L en el primer riego, ó repartir en 2 aplicaciones de 15 L c/u en los dos primeros riegos.	30 L / ha	Riego rodado Riego por goteo
Algodón	Repartir la dosis en 2 aplicaciones 1ª aplicación a la siembra. 2ª aplicación al inicio del cuadro.	Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego rodado Riego por goteo
Cereales Avena Arroz Sorgo Maíz Trigo Centeno Azafrán	Aplicar en el primer riego en una sola dosis.	20 L / ha	Riego rodado
Todo tipo de frijoles	Aplicar en el primer riego en una sola dosis.	15 L / ha	Riego rodado
Moras Zarzamora Frambuesa	Repartir la dosis en 2 aplicaciones iguales. 1ª aplicación en la fase de floración (ensaye). 2ª aplicación al inicio de la fructificación.	Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego rodado Riego por goteo
Fresa Tabaco	Repartir la dosis en 2 aplicaciones 1ª aplicación 10 días después del trasplante. 2ª aplicación 30 días después de la primera.	Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego rodado Riego por goteo
Cacahuates	Repartir la dosis en 2 aplicaciones. 1ª aplicación después del primer par de hojas verdaderas. 2ª aplicación 30 días después de la 1ª.	Total 20 L / ha 1ª 10 L / ha 2ª 10 L / ha	Riego rodado

Notas:

- Diluir en suficiente agua antes de aplicar
- Checar el pH de agua. Se recomienda utilizar agua para el riego con pH en rango de acidez.
- Ergo[®] Sol es compatible con cualquier insumo agrícola. Para asegurar, recomendamos realizar una pequeña prueba de compatibilidad.