

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
Hortalizas Tomate Chile Pepino Berinjena Calabaza	De 1 a 2 aplicaciones 1 ^a aplicación: antes del trasplante. 2 ^a aplicación a los 8 días después de la aplicación.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-2 kg / ha	Aplicación Foliar
Brócoli Coliflor Sandía Melón	De 1 a 2 aplicaciones 1 ^a aplicación: antes del trasplante. 2 ^a aplicación a los 8 días después de la aplicación.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-2 kg / ha	Aplicación Foliar
Algodón Ajo Cebolla Frijol	De 2 a 3 aplicaciones 1 ^a aplicación: Después del trasplante o después de emerger la planta. 2 ^a y 3 ^a aplicaciones posteriores: Cada 2 semanas después de la aplicación anterior.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-2 kg / ha 3 ^a 1-2 kg / ha	Aplicación Foliar
Maíz Trigo Avena Cebada Sorgo Azafrán Centeno Arroz Chicharo	De 1 a 2 aplicaciones 1 ^a aplicación: cuando la planta tenga 2 hojas verdaderas. 2 ^a aplicación a los 15 días después de la aplicación anterior.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-2 kg / ha	Aplicación Foliar
Caña	De 1 a 2 aplicaciones 1 ^a aplicación: después del trasplante de la planta. 2 ^a aplicación a los 15 días después de la aplicación anterior.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-3 kg / ha	Aplicación Foliar
Papa Camote	De 1 a 2 aplicaciones 1 ^a aplicación: 8 días después de emergida la planta. 2 ^a aplicación: a los 8 días después de la aplicación anterior.	1 ^a 1-2 kg / ha 2 ^a 1-2 kg / ha	Aplicación Foliar