



Ergo® Gibb Micro

Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

Aplicaciones Foliaras

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
Tomate, Chile.	Cada Floración.	4 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Pepino.	En Floración.	2 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Sandía, Melón.	21 días antes de la cosecha.	5 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Papa.	Sumerja los tubérculos 10 minutos. Antes de Floración.	1 Frasco por 100 L. de agua. 2 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Uva sin Semilla.	Plena Floración. A caída de pétalos.	1 Frasco por 100 L. de agua. 3 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Uva con Semilla.	Cuando la mayoría de los racimos tengan una longitud de 3-4 cm.	1 Frasco por 100 L. de agua.	Foliar
Limón Toronja.	Al cambio de color comercial.	1 Frasco por 100 L. de agua.	Foliar
Naranja.	30-40 días antes de la cosecha. Cuando la fruta tenga su color comercial.	1 Frasco por 100 L. de agua. 1 Frasco por 100 L. de agua.	Foliar
Claveles.	Cuando los brotes tengan de 2.5 a 3.0 cm. de longitud.	4 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Crisantemos.	Al inicio de Desarrollo.	3 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar
Rosas.	30 - 40 días antes de Floración. Cuando los brotes tengan 2.5-3.0 cm. de longitud.	4 Frascos por 100 L. de agua. 2 Frascos por 100 L. de agua.	Foliar