



Ergo® Kel

Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

Aplicaciones Foliares

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
Hortalizas Tomate Chiles Pepino Berenjena Brócoli Coliflor Sandía Melón Calabaza	Aplicaciones continuas 1ª aplicación 8 días después del trasplante o después de la emergencia de la planta. 2ª aplicación a los 15 días. 3ª se recomienda aplicar en fase floración repetir cada 15 días y después del corte de frutos.	250-500 cc / ha 500 cc - 1.0 L / ha 500 cc / ha	Foliar
Cebolla Ajo Papa Camote Remolacha	Total 3 aplicaciones 1ª aplicación 15 días después de la emergencia de la planta. 2ª aplicación 15 días después de la primera aplicación. 3ª aplicación 15 días después de la 2ª aplicación.	1ª 500 cc / ha 2ª 750 cc / ha 3ª 1 L / ha	Foliar
Algodón	Total de 4 aplicaciones 1ª aplicación 8 días después de la emergencia de la planta. 2ª, 3ª y 4ª aplicación 15 días después de la anterior.	1ª 250 cc / ha 2ª, 3ª y 4ª usar 500 cc / ha	Foliar
Frutales y Cítricos	Árboles de alto porte, total 3 aplicaciones 1ª aplicación antes de la floración. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación. Árboles de bajo porte, total 3 aplicaciones 1ª aplicación antes de la brotación. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 1.0 a 1.5 L / ha 2ª 1.0 a 1.5 L / ha 3ª 1.5 a 2.0 L / ha 1ª 0.5 a 1.0 L / ha 2ª 0.5 a 1.0 L / ha 3ª 0.5 a 1.0 L / ha	Foliar Foliar
Cultivos básicos: Maiz Sorgo Trigo Arroz	Total de 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación 15 días después de emergido. 2ª aplicación antes de la floración. 3ª aplicación antes de la fructificación.	1ª 500 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 1.0 L / ha	Foliar
Frijol Soya	Total de 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación 8 días después de emergido. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 250 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 500 cc / ha	Foliar
Caña	Total de 3 aplicaciones. 1ª aplicación a los 15 días de emergido. 2ª aplicación a los 30 días después de la primera aplicación. 3ª aplicación a los 30 días después de la segunda aplicación.	1ª 500 cc / ha 2ª 1.0 L / ha 3ª 1.0 L / ha	Foliar
Moras	Aplicaciones continuas 1ª aplicación al inicio de la brotación. 2ª aplicación al formar los frutos. 3ª aplicación durante la fructificación.	1ª 250 cc / ha 2ª 500 cc / ha 3ª 500 cc / ha	Foliar
Floricultura Ornamentales	Aplicaciones continuas Aplicar cada 15 días	250 a 500 cc / ha	Foliar