



# Ergo<sup>®</sup> Amin L Forte

## Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

### Aplicaciones Foliare

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
<b>Hortalizas</b>	Aplicaciones Continuas 1ª aplicación una semana después del trasplante ó después de que la planta ha emergido. 2ª aplicación 10 días después de la 1ª aplicación, cada 10 a 15 días en cada aplicación de agroquímicos. 3ª, 4ª, y aplicaciones posteriores, 10 días después de la 2ª aplicación.	1ª 250-500 cc / ha 2ª, 3ª y 4ª 250-500 cc / ha	Aplicación Foliar
<b>Papa Remolacha Camote</b>	Total de 3 aplicaciones 1ª aplicación 15 días después de que la planta ha emergido. 2ª aplicación 15 días después de la primera aplicación. 3ª aplicación 15 días después de la segunda aplicación.	1ª 500 cc / ha 2ª 750 cc / ha 3ª 1 L / ha	Aplicación Foliar
<b>Algodón</b>	Total de 4 aplicaciones 1ª aplicación al inicio de la floración. 2ª, 3ª y 4ª aplicación 15 días después de la anterior.	1ª 500 cc / ha 2ª, 3ª y 4ª 500 cc / ha	Aplicación Foliar
<b>Frutales y Cítricos</b>	Árboles de Alto Porte. Total de 3 Aplicaciones 1ª aplicación antes de la floración. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación y producción. Árboles de Bajo Porte. Total de 3 Aplicaciones 1ª aplicación antes de la floración. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación durante la fructificación y producción.	Árboles de Alto Porte 1ª 1.0 a 1.5 L / ha 2ª 1.0 a 1.5 L / ha 3ª 1.0 a 1.5 L / ha  Árboles de Bajo Porte 1ª 0.5 a 1.0 L / ha 2ª 0.5 a 1.0 L / ha 3ª 0.5 a 1.0 L / ha	Aplicación Foliar  Aplicación Foliar
<b>Cultivos básicos y Cereales</b>	De 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación 20 días después de que la planta ha emergido. 2ª aplicación. Repetir antes de la floración. 3ª aplicación. Repetir antes de la fructificación.	1ª 0.5 a 1.0 L / ha 2ª 0.5 a 1.0 L / ha 3ª 0.5 a 1.0 L / ha	Aplicación Foliar
<b>Frijoles</b>	De 2 a 3 aplicaciones. 1ª aplicación antes de la floración. 2ª aplicación durante la floración. 3ª aplicación. Repetir antes de la fructificación.	1ª 250-500 cc / ha 2ª 250-500 cc / ha 3ª 250-500 cc / ha	Aplicación Foliar
<b>Caña</b>	Total de 3 aplicaciones. 1ª aplicación 20-30 días después de la siembra. 2ª aplicación 25-30 días después de la 1ª aplicación. 3ª aplicación 25-30 días después de la 2ª aplicación.	1ª 500 cc / ha 2ª 1.0 L / ha 3ª 1.0 L / ha	Aplicación Foliar
<b>Moras Fresas Arándanos</b>	Aplicaciones Continuas 1ª aplicación al inicio de la floración. 2ª aplicación al inicio de la formación de frutos. 3ª, 4ª, 5ª, y aplicaciones subsecuentes cada 15 días.	1ª 250 cc / ha 2ª y demás 500 cc / ha	Aplicación Foliar
<b>Floricultura</b>	Aplicaciones Continuas Aplicar cada 2-3 semanas	Cada aplicación de 500 cc en 100 L de agua. Dosis aprox. / ha	Aplicación Foliar
<b>Cultivos en Stress</b>	Una o más Aplicaciones Cuando el stress esté presente debido a condiciones adversas. Aplicar tantas veces como sea necesario con intervalos de 1 a 2 semanas entre cada aplicación.	Cada aplicación de 500 cc / ha	Aplicación Foliar
<b>Aplicación al Suelo</b>			
<b>Todos los cultivos</b>	3 ó más Aplicaciones 1ª aplicación durante la época de crecimiento. 2ª aplicación durante la época de floración. 3ª aplicación durante la época de fructificación.	Cada aplicación de 2-4 L / ha	Riego por Goteo Riego Rodado Micro Aspersión Hidroponía Semi-Hidroponía