



Ergo[®] Nik-Kel

Recomendaciones y Dosis en Diferentes Cultivos

Aplicaciones Foliaras

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis	Aplicación
Hortalizas, algodón, cítricos y papa.	De 2 a 6 aplicaciones 1 ^a aplicación: antes del trasplante. aplicaciones posteriores: Cada 2 semanas después de la aplicación anterior.	0.400 - 0.800 kg / ha	Aplicación Foliar
Cultivos anuales: arroz, frijol, maíz, trigo, soya, etc.	De 1 a 3 aplicaciones 1 ^a aplicación: Después del trasplante o después de emerger la planta. 2 ^a y 3 ^a aplicaciones posteriores: Cada 2 semanas después de la aplicación anterior.	0.240 - 0.480 kg / ha	Aplicación Foliar
Frutales bajo porte.	De 2 a 3 aplicaciones 1 ^a aplicación: antes del trasplante. aplicaciones posteriores: Cada 2 semanas después de la aplicación anterior.	0.400 - 0.800 kg / ha	Aplicación Foliar
Frutales alto porte.	De 2 a 5 aplicaciones 1 ^a aplicación: antes del trasplante. aplicaciones posteriores: Cada 2 semanas después de la aplicación anterior.	0.800 - 1.600 kg / ha	Aplicación Foliar