

“NOGAL-MANZANO-DURAZNO-GUAYABA”

RECOMENDACIONES Y DOSIS:

ETAPA	PRODUCTOS	DOSIS POR HECTÁREA	APLICACIÓN
Brotación y Post-Cosecha	• Ergo® Set 20G	60 kg/ha	1ª Aplicación: 30 kg/ha de Ergo® Set 20G, al suelo mezclado con el fertilizante granulado, al inicio de la brotación. 2ª Aplicación: 30 kg/ha después de la cosecha.
Crecimiento	• Ergo® Set LSS	20 kg/ha	1ª Aplicación: 10 kg/ha al inicio de la brotación. 2ª Aplicación: 10 kg/ha después de la cosecha. Vía Riego por Goteo, Gravedad o Drench. En el segundo tercio de la zona de goteo.
Floración	• Ergo® Crop • Ergo® Stim • Ergo® Win	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos al inicio de la brotación (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha). 2ª Aplicación 15 días después de la 1ª aplicación (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® Win 2 kg/ha).
Maduración	• Ergo® Crop • Ergo® Stim • Ergo® K Excel	1 L/ha 1 L/ha 4 kg/ha	1ª Aplicación foliar de los 3 productos al inicio de formación de fruto, y en caso del nogal cuando el ruezno esté gelatinoso (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha). 2ª Aplicación 30 días después de la 1ª aplicación (Ergo® Crop ½ L/ha + Ergo® Stim ½ L/ha + Ergo® K Excel 2 kg/ha).

